

# Auswahl zugelassener Herbizide in Sojabohne 2020

Produkt	Wirkstoff	Wirkungsmechanismus nach HRAC-Code	Aufwandmenge/ha	Preis in EUR/ha <sup>2)</sup>	Ackerkratzdistel	Acker- und Zaunwinde	Quecke/Johnsongras	Hühnerhirse	Gelbe Borstenhirse	Amarant	Franzosenkraut	Kamille	Klettenlabkraut	Knöterich	W. Gänsefuß/Melde	Schw. Nachtschatten	Zweizahn	Ambrosie (Ragweed)	Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern in m <sup>3)</sup>	Abstände zu Gewässern bei Abtragsgefahr in m <sup>5)</sup>	
<b>Vorauflauf<sup>1)</sup>:</b>																					
Artist	Metribuzin+Flufenazet	K3+C1	2 kg	77,30	0	0	0	++(+)	++(+)	+++ <sup>8)</sup>	+++	++(+)	+++	++	+++ <sup>8)</sup>	++(+)	0	++(+)	20/10/5/3	G-10	-
Spectrum/Orefa Di-Amide-P/Spektral Uni	Dimethenamid-P	K3	1-(1,4) l	29,00-40,70/25-35/25-35	0	0	0	+++	+++	+++	++(+)	+++	+	+(+)	+(+)	++	0	+	15/10/5/5(20/10/5/5)	G-20	-
Proman	Metobromuron	C2	2,5 l	80,60	0	0	0	+(+)	++	++(+)	++	++(+)	+	++	++(+)	+(+)	++	++	5/1/1/1	n.z.	
Stomp Aqua	Pendimethalin	K1	1,5 l	25,40	0	0	0	++	++	+++	0	++	++	++	+++	++	0	+	15/10/5/5	-	15/10/5/5
Spectrum Plus	Pendimethalin+Dimethenamid-p	K1+K3	2,5 l	41,00	0	0	0	+++	+++	+++	++(+)	++	++	++	+++	++	0	+	30/15/15/5	G-20/10/10/10	30/15/15/10
Dual Gold/Basar	s-Metolalchlor	K3	1,25 l	35,80/-/31,40	0	0	0	+++	+++	+	0	(+)	(+)	0	0	0	0	0	5	-	10
Successor 600	Pethoxamid	K3	2 l	61,20	0	0	0	++(+)	++(+)	++(+)	++(+)	++(+)	+	+	+(+)	+(+)	+(+)	+	15/10/5/1	n.z.	
<b>Nachauflauf gegen 2-keimblättrige Unkräuter:</b>																					
Harmony SX+Zellex CS	Thifensulfuron-Methyl +NM	B	Split.: 2 x 7,5 g+0,1% Zellex CS	21,00	++ Split.	++ Split.	0	0	0	+++ <sup>9)</sup>	+++	+++	++	++(+)	+++ <sup>9)</sup>	0	+++	+	5/5/1/1	-	-
Pulsar 40 <sup>7)</sup> Splittingzulassung nach Art.53 <sup>4)</sup> wird erwartet	Imazamox	B	Split.: 2 x 0,5 l oder 1,25 l	54,60-68,30	++	++	0	+(+)	++(+)	+++ <sup>9)</sup>	++	++	++	++(+)	++(+) <sup>9)</sup>	+++	++	++	1	G-10	-
<b>Nachauflauf gegen Gräser:</b>																					
Agil-S/Zetrola	Propaquizafop	A	0,75 l (1 l) <sup>6)</sup>	26,70 (35,60)/26,50 (35,30)	0	0	++(+)	+++	++(+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-
Focus Ultra	Cycloxydim	A	1,25 - 1,5 l (2,5 l) <sup>6)</sup>	33,00-39,60 (66,00)	0	0	++(+)	+++	+++	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-
Fusilade Max	Fluazifop-P-butyl	A	1 l (2 l) <sup>6)</sup>	27,30 (54,60)	0	0	+++	+++	++(+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	n.z.	
Targa super	Quizalofop-P-ethyl	A	0,5 l + 1 l Öl (1 l + 2 l Öl) <sup>6)</sup>	38,30 (76,60)	0	0	+++	+++	+++	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-

Wirksamkeiten: +++: sehr gut wirksam; ++: gut bis ausreichend wirksam, +: Teilwirkung, nur bei kleineren Unkräutern unter günstigen Bedingungen ausreichend wirksam, 0: keine Wirkung; rot: Zusatzwirkung; <sup>1)</sup> Wirksamkeiten sind nur bei feuchten, feinkrümeligen Boden gegeben; <sup>2)</sup> Preisbasis: unverb. empf. Listenpreise für durchschnittlich 5-10 ha-Gebinde (RWA 2019) exkl. Mwst.; <sup>3)</sup> Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern: Regelabstand / 50 % / 75 % / 90 % Abtriftminderungskategorie; <sup>4)</sup> Notfallzulassung nach Art.53, Verwendung vom 1.4.-30.07.20; <sup>5)</sup> Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein jeweiliger Mindestabstand in Meter (je nach Düse kann er unterschiedlich sein) und wenn angegeben auch ein bewachsener Grünstreifen (G) einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden - außer wenn extra angegeben; n.z. bedeutet, dass bei Abtragsgefährdung die Anwendung nicht zulässig ist; mit Maßnahmen, wie z.B. Unkrautbekämpfung im Nachauflauf, Bodenbedeckung (mit Mulch, Begrünungen, Zwischenfrüchten), rauhes Saatbett, Grünstreifen usw. kann das Risiko reduziert werden; Abkürzungen: Split.: Splitting; k.A.: keine Angabe; NM: Netzmittel; <sup>6)</sup> Aufwandmengen für Quecke und Johnsongras; Alle Angaben ohne Gewähr; <sup>7)</sup> Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode, wobei die Anwendung nur alle 3 Jahre auf derselben Fläche erfolgen darf. Keine zusätzlichen Anwendungen mit anderen Mitteln, die den Wirkstoff Imazamox enthalten. <sup>8)</sup> nicht triazinresistent; <sup>9)</sup> ausgenommen resistenter Amaranth und resistenter Weißer Gänsefuß.  
Greimel LK STMK 1/2020